

BRUIXA DE QUATRE TAQUES

Lepidorhombus boscii (Risso, 1810)


Noms FAO: es gallo fr cardine à quatre taches
en fourspotted megrim

Sin. compl.: bruixa, misèria*, llisèria, palaia bruixa, serrandell

Codi FAO: LDB

Fórmula radial: D. 79-86 A. 65-69

Talla: màxima 40 cm, comuna de 10 a 30 cm.



Diagnosi

Cos ovalat i allargat. Boca gran, en posició terminal i amb la mandíbula inferior lleugerament prominent. Dents petites, algunes sobre el vómer. Els ulls es troben al costat esquerre del cap, molt junts, i de diàmetre superior a la longitud del musell. Septe branquial perforat per un gran foramen. Vora posterior del preopercle lliure. Les aletes dorsal i anal acaben a la cara sense ulls del peduncle caudal. Pectoral ben desenvolupada a la cara ocular, molt poc a l'altra. Aletes pèlviques de bases iguals i llargues. Línia lateral amb 87-93 escates, formant una corba sobre la pectoral. Escates ctenoidees (rugoses) a la cara ocular i cicloidees (llises) a l'altra. Color marronós sense marques definides al cap i cos. Dues taques fosques a la part posterior de la dorsal i anal. Coloració molt variable gràcies a la presència de gran quantitat de cromatòfors, que li confereixen una gran capacitat críptica per camuflar-se amb el substrat que el rodeja.

Comportament i distribució geogràfica

Demersal sobre fons tous profunds de la plataforma continental i del talús, fins als 800 m, sobretot de 100 a 400 m. Es reproduïx en aigües profundes de març a abril. S'alimenta de petits peixos, crustacis i cefalòpodes.

Es troba a la Mediterrània Occidental i part de l'oriental, i a l'Atlàntic, de les illes Britàniques al cap Bojador.

Pesca

És una espècie valorada i de gran interès comercial. Pesca semiindustrial i artesanal, amb tremall i arts d'arrossegament de fons, sobretot com a subproducte de la pesca de gamba al talús. Es troba regularment als mercats i es consumeix fresc, refrigerat o congelat.

TALLA MÍNIMA LEGAL DE CAPTURA: 15 cm

Ordre: Pleuronectiformes

Família: Scophthalmidae