



# CABROT\*

*Paromola cuvieri* (Risso, 1816)



**Noms FAO:** **es** paromola **fr** paromole **en** paromola

**Sin. compl.:** cabró\*, cabra de fons\*, cabra\*, cranc de fons\*

**Codi FAO:** OLV

Talla: màxima longitud de la closca 21, 5 cm,  
comuna 10-16 cm.

## Diagnosi

Cos alt, més llarg que ample, assolint la màxima amplada al nivell de la regió branquial. Closca de contorn gairebé quadrangular i la superfície dorsal coberta de nombroses espines i curta pubescència. Vora frontal amb tres dents agudes. Espines especialment llargues són les supraoculars, tant llargues com el rostre. Vores laterals convexes. Per dins de les vores laterals espinoses, un solc denominat línia homoliana recorre la closca en tota la seva longitud, des de la part anterior de la regió hepàtica fins a la vora posterior. Quelípodes més llargs que el cos, espinosos i amb una espessor de pèls als dits. Als mascles són més llargs que les potes ambulatories, en les femelles més curts. Els tres parells de potes següents més primes i també espinoses. L'últim parell molt més curt, i dirigit cap amunt i amb una subquela prènsil. Color vermell clar o ataronjat groguenc, amb les espines i les potes d'un vermell més pujat. Quelípodes amb els dits negres.

## Comportament i distribució geogràfica

Demersal per sobre de fons fangosos i sorrencs, de vegades prop de les fonts hidrotermals, de 50 a 100 m, generalment de 80 a 350 m. Femelles ovígeres (amb posta) al març, maig, juliol, octubre i novembre. Sovint porta actínies o gorgònies als pereiòpodes del cinquè parell de potes. Es troba a la Mediterrània Occidental i a l'Atlàntic, d'Angola a Escandinàvia.

## Pesca

Es pesca de manera artesanal i com a preses accessòries de la pesca semiindustrial, amb arts d'arrossegament i tremalls. El trobem ocasionalment als mercats, on es comercialitza fresc.

NO ESTÀ REGULADA NI TÉ TALLA MÍNIMA LEGAL

**Ordre:** Decapoda (Reptantia)

**Família:** Homolidae