



CASTANYOLA

Brama brama (Bonnaterre, 1788)



Noms FAO: es japuta fr grande castagnole en Atlantic pomfret

Sin. compl.: saputa

Codi FAO: POA

Fórmula radial: D 35-38 A. 29-32

Talla: màxima 70 cm, comuna de 30 a 50 cm.

Diagnosi

Cos d'alçada moderada i comprimit. Cap amb el perfil dorsal molt convex, i l'espai interorbitari molt arrodonit. Maxil·lar ample i amb escates. Vora inferior de les mandíbules en contacte amb la línia mitjana ventral darrera la sínfisi. De 14 a 18 branquispines al primer arc branquial. Les aletes dorsal i anal, amb bases molt llargues i de lòbul anterior falciforme. Les pectorals van més enllà del lòbul de l'anal. Les pèlviques són curtes, amb una gran escata axil·lar. Línia lateral no gaire visible als adults. Escates llises de vores desiguals, recobrint el cap i el cos. Sèries longitudinals de 70 a 80 escates. De 41 a 43 vèrtebres. Color negre argentat, amb les aletes més clares. Interior de la boca fosc.

Comportament i distribució geogràfica

Espècie oceànica pelàgica o mesopelàgica. Ocasionalment, fins als 800 m, en aigües de 12 a 24°C. Migra seguint les isotermes estacionals en petites moles, de vegades per parelles. A l'hivern es troba en aigües profundes i a l'estiu prop de la costa, on probablement realitza la fresa. Es reproduïx d'agost a setembre, i els seus ous són pelàgics. S'alimenta d'amfípodes pelàgics, eufausiids, cefalòpodes i petits peixos. Es troba a la Mediterrània Occidental i part de l'oriental, i també als oceans Atlàntic, Índic i Pacífic Sud.

Pesca

De carn molt apreciada, tot i que sovint està fortament parasitada, però sense que això arribi a representar cap perill per a l'home. Pesca artesanal i esportiva, amb palangres, arts d'encerclament, arrossegament, tremalls, línies de mà i curricà. Es troba irregularment als mercats i es comercialitza fresca o congelada, encara que pot ser retirada de la venda pel seu parasitisme.

TALLA MÍNIMA LEGAL DE CAPTURA: 16 cm

Ordre: Perciformes

Família: Bramidae