

CAP D'ASE

Eutrigla gurnardus (Linnaeus, 1758)

Noms FAO: es borracho fr grondin gris en grey gurnard
Sin. compl.: capsec, lluernà, lluernà verda, oriola vera, rafet
Codi FAO: GUG

Fórmula radial: D. VII-X, 18-20. A. 17-20.

Talla: màxima 60 cm, comuna de 15 a 40 cm.



Diagnosi

Cap massiu, cuirassat de plaques òssies, amb crestes i espines, però sense solc occipital marcat. Musell bastant agut, rostre poc escotat. Espina cleitral (sobre les pectorals) de longitud mitjana. Dues aletes dorsals separades. Pectorals curtes, sense arribar al nivell de l'anal, i amb els tres radis inferiors lliures, independents i digitiformes, que usen com a òrgans locomotors i com a detectors de preses gràcies als nombrosos receptors sensorials. Escates recobrint tot el cos, les de la línia lateral més grans que les altres, de vora lliure denticulada i armades d'una forta espina mitjana. Pit nu i ventre parcialment amb escates. Primer arc branquial amb 10-14 branquispines totals. Color variable, generalment marró grisenc i vermellós al dors i costats, amb el ventre color crema. Línia lateral blanquinosa, i costats sovint amb petits punts blancs. Una gran taca negra sobre la dorsal espinosa.

Comportament i distribució geogràfica

Bentònica sobre fons sorrencs o fangosos de la plataforma continental, de vegades sobre fons durs, de 20 a 300 m, sobretot de 50 a 150 m. Es reproduïx de febrer a agost. Els ous i alevins són pelàgics fins que assoleixen 3 cm. S'alimenta de crustacis i peixos, mentre que les larves ho fan de zooplàncton. Es troba a tota la Mediterrània, incloent el mar Negre, i a l'Atlàntic, del Cap Nord a Mauritània.

Pesca

Pesca semiindustrial i artesanal amb arts d'arrossegament, tremall, línies de mà i palangres de fons. Es troba regularment als mercats de la Mediterrània occidental i Turquia, i es comercialitza fresc.

NO ESTÀ REGULADA NI TÉ TALLA MÍNIMA LEGAL

Ordre: Scorpaeniformes

Família: Triglidae