



GARNEU

Trigla lyra Linnaeus, 1758



Noms FAO: es garneo fr grondin-lyre en piper gurnard

Sin. compl.: ase, clau, paona*, rafel, rafelet, rafet

Codi FAO: GUN

Fórmula radial: 1D. VIII-X; 2D. 16-17; A. 16-19

Talla: màxima 60 cm; comuna de 10 a 40 cm.

Diagnosi

Cos més o menys fusiforme, més alt i gruixut a la regió anterior, que no pas en la posterior, i recobert de petites escates. Línia lateral, amb més de 100 escates tubulars. Cap fort, cuirassat per un revestiment de plaques òssies; musell molt marcat, amb una clara escotadura aforquillada. El fibló escapular (coracoides) està molt desenvolupat, arribant fins a la vertical, que passa per la meitat de les pectorals. De 7 a 11 branquispines, al primer arc branquial. Dues aletes dorsals molt juntes; la primera, que és espinosa, molt més curta que la segona, que és oposada a l'anal i amb tots els radis tous. Les pectorals grans i amples, amb els tres radis inferiors independents i mòbils. Les ventrals, en posició toràcica, presenten una espina i 5 radis tous. L'aleta anal sense espines, sol amb radis tous. Coloració general rosada o vermell viu, sobretot al dors i a la meitat superior dels flancs; ventre i la part inferior del cap de color blanc rosat.

Comportament i distribució geogràfica

Espècie bentònica sobre fons detrítics i de fang, entre els 50 i 700 m, però sobretot, entre els 150 i 400 m. S'alimenta de crustacis, cucs, equinoderms, mol·luscs i peixos. La reproducció té lloc a l'estiu. La primera maduresa sexual es produeix quan tenen 30 cm. S'estén arreu de la Mediterrània, excepte a la mar Negra. A l'Atlàntic Oriental, des de les illes Britàniques, Portugal, illes Madeira i el Marroc fins a Namíbia.

Pesca

Espècie comercial de carn, relativament, apreciada. Pot formar part de la morralla. Pesca semiindustrial i artesanal. Es captura amb arts de platja, de ròssec, línies de mà, tremalls i palangres de fons.

NO ESTÀ REGULADA NI TÉ TALLA MÍNIMA LEGAL

Ordre: Scorpaeniformes

Família: Triglidae