



LLAMÀNTOL

Homarus gammarus (Linnaeus, 1758)



Noms FAO: es bogavante fr homard européen
en European lobster

Sin. compl.: llomàntol*, llobregant, grimalt, llamanto

Codi FAO: LBE

Talla: màxima longitud 60 cm., comuna de 23 a 50 cm.

Diagnosi

Closca llisa, només presenta dos parells d'espines darrere els ulls, l'externa molt petita. El rostre és fort i fa una quarta part de la llargada de la closca, amb les vores laterals armades de quatre o cinc dents. La seva base s'encorba primer cap avall i després es manté horitzontal. Un solc mitjà s'estén de la punta del rostre a la part posterior de la closca. Segments abdominals llisos, sense dents ni crestes. El primer parell de pereiòpodes acaben en unes grans pinces, l'una tallant i l'altra esmicoladora. El segon i tercer parell de pereiòpodes molt més petits, però també amb pinces. Coloració de la part ventral groguenca, i el dors amb moltes taques de color negre blavós, molt denses a la closca i abdomen, més espaiades a la resta del cos.

Comportament i distribució geogràfica

És demersal sobre fons rocosos de 0 a 150 m, generalment fins als 50 m de fondària. És una espècie sedentària, molt territorial. Es reproduïxen a l'estiu i les femelles porten els ous durant 10 o 11 mesos. S'alimenten de mol·luscs, cucs, i peixos morts, i són animals nocturns, amagant-se durant el dia.

Es troba a gairebé tota la Mediterrània, i a la vora oest del mar Negre. Així mateix, a l'Atlàntic Oriental, des del Marroc a Escandinàvia.

Pesca

De carn molt apreciada, que és objecte de cultiu, es captura especialment les nits d'estiu, quan és més abundant. Pesca generalment artesanal semiindustrial, amb nanses, gàbies, línies de mà i tremall, alguns amb l'arrossegament i fins i tot a mà. Es troba ocasionalment als mercats, i es comercialitza fresca o congelada.

TALLA MÍNIMA LEGAL DE CAPTURA: 8,5 cm
longitud de cefalotòrax i 24 cm de longitud total.

Ordre: Decapoda (Reptantia)

Família: Nephropidae