



# SÈPIA

*Sepia officinalis* Linnaeus, 1758



**Noms FAO:** es choco fr seiche commune en common cuttlefish

**Sin. compl.:** sípia

**Codi FAO:** CTC

Talla: màxima longitud del mantell 35 cm, comuna de 15 a 25 cm.

## Diagnosi

Cos robust i aplanat dorsoventralment. Projecció del mantell sobre el cap formant un angle obtús. Tentacles robustos, unes tres vegades més llargs que el braç més llarg (IV). Massa tentacular mesura 1/5 de la longitud del tentacle, i amb cinc o sis fileres longitudinals de ventoses, de les quals cinc o sis són més grans a la fila mitjana. Ectocòtil (braç ventral esquerre) amb cinc a vuit fileres proximals de ventoses molt reduïdes. Coloració variable, d'un marró grisenc molt pàl·lid a un marró fosc jaspiat. Ratllat als adults sexualment madurs, més marcats als mascles.

## Comportament i distribució geogràfica

Espècie demersal, nerítica, sobre fons sorrencs, fangosos, o coberts d'algues i fanerògames, de la costa fins als 200 m, abundant a partir dels 100 m. Efectua migracions cap a la costa per reproduir-se. La posta es realitza en aigües someres durant tot l'any, sobretot de febrer a octubre. Els ous són característics per l'embolcall pigmentat negre o marró fosc, i perquè es fixen en tiges d'algues i posidònies. Viuen un màxim de 18 a 30 mesos. S'alimenta de gambes, crancs i peixos. Es troba a tota la Mediterrània, i a l'Atlàntic, del Marroc a Escandinàvia.

## Pesca

És una espècie abundant, i de gran interès comercial. Es pesca de manera industrial, semiindustrial i artesanal, amb arts d'arrossegament, tremall, palangre, gàbies, nanses, línies de mà i potera. Es troba regularment als mercats i es comercialitza fresca, refrigerada, congelada i salada.

NO ESTÀ REGULADA NI TÉ TALLA MÍNIMA LEGAL

**Ordre:** Sepioidea

**Família:** Sepiidae