

# ESPARDENYA



*Stichopus regalis* Cuvier, 1817

**Noms FAO:** **es** cohombro **fr** holothurie jaune **en** royal cucumber

**Sin. compl.:** espardenyà de mar\*, llongo, llonguet, pastisset\*, llenguèt\*

**Codi FAO:** JCR



Talla: màxima longitud 35 cm, amplada 7 cm.

## Diagnosi

Cos bastant deprimit amb un replec lateral que té grans papil·les i separa les cares dorsal i ventral. Cara dorsal amb tubercles més o menys alineats en fileres longitudinals i acabant en papil·les còniques. Cara ventral en forma de sola, amb tres bandes més o menys visibles de podis. De 18 a 20 tentacles bucal. Gònades formant dos feixos de túbuls, un a cada costat del mesenteri dorsal. Òrgans de Cuvier sempre absents. Espícules en plaques, de base llarga i fortament perforades o en forma allargada, i també perforades. Coloració dorsal marró clar, sovint amb petites taques blanques. Cara ventral blanquinosa amb una ampla zona longitudinal central rosa.

## Comportament i distribució geogràfica

Espècie bentònica molt comuna de 5 a 800 m de fondària sobre fons detrítics i sobretot argilosos, on coexisteix amb altres equinoderms (*Echinus acutus* i *Ophiura ophiura*). Sovint hoste dels peixos del gènere *Carapus*, que s'alimenten dels seus òrgans sexuals. Els sexes estan separats, encara que no hi ha dimorfisme sexual (la morfologia dels mascles i les femelles és similar).

Es troba a la Mediterrània Occidental, i a l'Atlàntic est, de les illes Canàries a Irlanda, i oest, a les Antilles i golf de Mèxic.

## Pesca

Espècie molt apreciada i cotitzada a Catalunya. Es captura amb arrossegament i dragues en fons fangosos. Es menja oberta i condimentada.

NO ESTÀ REGULADA NI TÉ TALLA MÍNIMA LEGAL

**Ordre:** Aspidochirotes

**Família:** Stichopodidae